

DIAPHAG[®]

Gliclazide

FORME ET PRESENTATION:

Comprimés blancs quadri-sécables dosés à 80mg de gliclazide.

Boîte de 60 comprimés.

COMPOSITION :

Gliclazide 80 mg

Excipients : gomme arabique, lactose monohydraté*, talc, stéarate de magnésium, q.s.p 1 comprimé

* Excipients à effet neutre.

PROPRIETES :

Le gliclazide est un hypoglycémiant de la famille des sulfonylurées, qui entraîne une baisse de la glycémie par une action sur la libération d'insuline par le pancréas et par une augmentation de la sensibilité cellulaire à l'insuline.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES:

Diabète non-insulino-dépendant et non-acidocétosique, lorsque le régime prescrit n'est pas suffisant pour rétablir à lui seul l'équilibre glycémique.

CONTRE-INDICATION :

- Diabète insulino-dépendant
- Diabète infantile et juvénile
- Précoma et coma diabétiques.
- Diabète acido-cétosique
- Insuffisance rénale ou hépatique grave
- Allergie aux sulfamides

EFFETS INDESIRABLES :

- Hypoglycémie qui se traduit par des étourdissements. Perte de l'énergie, somnolence, maux de tête, transpiration, nervosité, tremblements parésie (voir précautions d'emploi).
- Réactions gastro-intestinales, nausées, vomissement, plénitude épigastrique, diarrhées, aigreurs d'estomac.
- Réactions dermatologiques, réactions allergiques, prurit, érythème, urticaire, éruption morbiliforme ou maculopapulaire.
- Réactions hématologiques (exceptionnelles) leucopénies, thrombopénie, agranulocytose, anémie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- L'efficacité de ce médicament comme tout autre hypoglycémiant, n'est obtenue que lorsqu'il est associé à un régime hypoglycémique et/ou hypocalorique d'où respect des règles hygiéno-diététiques présentées par votre médecin.
- Surveillance régulière de la glycémie et de la glucosurie.
- Ne pas arrêter le traitement sans avis du médecin.
- En cas d'anorexie ou de nausées empêchant toute alimentation, arrêter le traitement et consulter votre médecin (risque d'hypoglycémie).
- En cas d'apparition du signe d'hypoglycémie (voir effets secondaires), prendre rapidement des sucres rapides (jus, chocolat sucre...) et consulter votre médecin pour une éventuelle adaptation posologique.
- En cas d'apparition d'autres effets indésirables consulter votre médecin.
- Ne jamais dépasser la dose de 320 mg/j soit 4 comprimés/ jour (dose toxique).
- Eviter la prise d'un autre médicament sans avis médical car risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie notamment :
 - * éviter la prise de boissons alcoolisées.
 - * anti-inflammatoires non-stéroïdiens (notamment aspirine).
 - * Sulfamides antibactériens, anticoagulants coumariniques, IMAO, β bloquants, diazépam, tétracyclines, maléate de perhexiline, chloramphénicol, clofibrate et miconazole comprimés. Des médicaments peuvent en revanche réduire l'effet hypoglycémiant du DIAPHAG.

GROSSESSE :

Ce médicament est contre-indiqué chez la femme enceinte.

ALLAITEMENT :

Demander conseil à votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Ce médicament présente des interactions avec d'autres médicaments. Eviter donc toute automédication.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale

Se référer à la dose prescrite par votre médecin.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit dans une situations précise.

Ne pas le conseiller à une autre personne.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Date de révision de la notice: Juillet 2010

Liste I

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

